

Een TPA (Transpalatal Arch.)

1

In het begin kan de beugel wat last geven en kunnen de kiezen los gaan staan. Eventueel een pijnstiller innemen.

2

Doosje met was gebruiken als de ringetjes scherp aanvoelen en de wangen geïrriteerd zijn.

3

Goed poetsen! Ook de beugel goed schoonhouden.

4

Wanneer de beugel stuk is altijd contact opnemen met de praktijk.

Bij onduidelijkheden en/of vragen kunt u altijd contact opnemen met de praktijk, wij leggen het dan graag nog eens aan u uit. Ook als de beugel los zit of stuk is; altijd contact opnemen met de praktijk, ook als er diezelfde dag de afspraak voor de controle staat.



R. M. Diels, MSD
Orthodontiepraktijk

TPA

**Orthodontiepraktijk
R.M. Diels**

Helvoirtseweg 134
5263 EH Vught

073-6840055
info@orthodiels.nl
www.orthodiels.nl



TPA (Transpalatal Arch.)

De palatinale boog is een metalen draad die loopt tussen de eerste blijvende kiezen links en rechts in de bovenkaak.

Hoe werkt de beugel?

De palatinale boog kan de eerste blijvende kiezen in de bovenkaak stabiliseren of actief verplaatsen of draaien. Ook kan de beugel worden gebruikt om via een toegevoegd armpje individuele andere tanden een zetje te geven. De palatinale boog kan worden gecombineerd met bijna alle andere beugels. De beugel zit vast in de mond je kan hem zelf niet in en uit doen.

Wennen en schoonhouden

In het begin zal je voelen dat er kracht op je kiezen wordt uitgeoefend, de kiezen zullen de eerste paar dagen gevoelig zijn. Ook zul je moeite hebben in het begin met praten en slikken dit zal enkele dagen duren en trekt daarna weer weg. Als de ringetjes scherp aanvoelen tegen je wangen, kun je de was er opplakken die je hebt meegekregen.

Houd de beugel en vooral de bandjes om de kiezen goed schoon, besteed extra aandacht aan het tandenpoetsen. Vooral aan de binnenkant daar waar de boog loopt.

Gaat er iets los aan de beugel, wacht dan niet tot de volgende afspraak.

Neem contact op met de praktijk om een afspraak in te plannen.

